

Anwendung / Uporaba / Upotreba

AT: Novalac Premium Gold 2 Folgemilch ist für Säuglinge ab dem Alter von 6 Monaten geeignet. Sie ist Teil einer Mischkost und soll nicht als Ersatz für die Muttermilch in den ersten sechs Lebensmonaten verwendet werden. Sie eignet sich als Zusatznahrung, wenn Stillen nicht möglich ist. Die Entscheidung über die Einführung der Zusatznahrung, ohne Ausnahme bis zum Alter von sechs Monaten, sollte nur nach Rücksprache mit Medizin-, Pharmazei- und Ernährungsexperten bzw. anderen Experten im Bereich der Mutter- und Babypflege unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse, für das Wachstum und die Entwicklung des Babys, getroffen werden. Novalac Premium Gold 2 ist Teil einer breiten Palette von Produkten, die speziell auf die Ernährungsbedürfnisse von Säuglingen abgestimmt sind. Ab dem Alter von 12 Monaten wird Folgemilchnahrung Novalac Premium Gold 3 oder Novalac 3 empfohlen.

Wichtige Hinweise / POMEMBNO OPOROZILO / Važna napomena

AT: Stiller ist die beste Ernährung für Ihr Baby. Wenn Sie eine Folgemilchnahrung verwenden möchten, sprechen Sie bitte mit Ihrem Kinderarzt. Aufmerksamkeit ist notwendig bei Kuhmilchallergie, bei Führgewohnen, bei Neugeborenen mit niedrigem Geburtsgewicht oder geschwächtem Immunsystem. Unsachgemäßße Zubereitung oder Lagerung der Folgemilchnahrung kann ein Gesundheitsrisiko darstellen. Wenn Sie Ihr Baby mit der Flasche füttern, vergewissern Sie sich, dass die Zähne Ihres Babys nicht zu oft oder zu lange mit Milch in Berührung kommen, sonst steigt die Kariesgefahr für Ihr Baby. Nach der letzten Mahlzeit in der Nacht reinigen Sie immer die Zähne Ihres Babys.

Dosierung / Odmerjanje / Dозиране

Alter (Monate) / Starost dojenčka (meseči) / Starost dojenčeta (mjeseci)

6-12

Anzahl der Mahlzeiten pro Tag / Število obrokov na dan / Broj obroka na dan

3*

Anzahl der Messlöffel pro Mahlzeit / Število meric za pripravo enega obroka / Broj mjerica za pripremu jednog obroka

7

Wasseranteil (ml) / Količina vode (ml)

210

* als Teil einer abwechslungsreichen Ernährung / kot del raznovrstne prehrane / kao dio raznolike prehrane

AT: Ein gestrichener Messlöffel der beigegeben ist, enthält 4,5 g Novalac Premium Gold 2. Lösen Sie einen Messlöffel in 30 ml Wasser auf. Nach Absprache mit Ihrem Kinderarzt oder Apotheker sollen Menge und Anzahl aller Tagesmahlzeiten an die Bedürfnisse Ihres Babys abgestimmt werden. Wenn der Kinderarzt Ihnen nichts anders empfiehlt, folgen Sie die Empfehlungen in der Tabelle.

• Immer eine frische Mahlzeit zubereiten.

• Vor Wärme und Licht schützen, an einem trockenen Ort aufbewahren.

• Mindestens halbtar bis: siehe Boden.

• Nach Öffnen der Dose / Inhalt innerhalb von 3 Wochen verbrauchen.

• Dose nach Gebrauch gut verschließen.

• Reste der Mahlzeit nicht aufzubewahren, sondern entsorgen.

Unter Schutzatmosphäre verpackt. / Pakirano v kontrollirano atmosferi. / Pakirano u kontroliranoj atmosferi.

Hergestellt in der EU / Proizvedeno v EU / Proizvedeno u EU

MEDIS | www.novalac.at | www.novalac.si | www.novalac.hr

SI: Novalac Premium Gold 2 nadaljevalno mleko je primožno za dojenčke, starejše od šestih mesecev. Je del raznolike prehrane, ki se v prvih šestih mesecih življenga ne sme uporabljati kot nadomestek za maternino mleko. Primeren je kot dopolnilna hrana, vključno z vaskršnjo izjemno do šestega meseca starosti, se sprejme samo po nasvetu strokovnjakov s področja medicine, farmacije oziroma prehrane ali drugih strokovnjakov s področja medicine, farmacije oziroma prehrane po posebnih potrebah in otroku, ob upoštevanju individualnih posebnih potreb za rast in razvoj dojenčka. Novalac Premium Gold 2 je del obsežnejših linij proizvodov. Za otroke, starejše od 12 mesecev svetujemo prehod na Novalac Premium Gold 3 ali Novalac 3 mlečni napitki.

HR: Novalac Premium Gold 2 miljuna hrana primjerena je za dojenčad od 6. mjeseci starosti nadalje. Dio je raznolike prehrane koja se u prvih šest mjeseci ne smije koristiti kao nadomestak za majčino mlijeko. Primjerice je kao dopuna hrani ako dojenčje nije dovoljno. Odluka o potpori upotrebe raznolike prehrane, uključujući svaki izuzetak do šestog mjeseca starosti, donosi se samo prema препорукama strokovnjaka s področja medicine, farmacije oziroma prehrane ali drugih strokovnjakov s področja medicine, farmacije oziroma prehrane po posebnih potrebah za razrast i razvoj dojenčka. Novalac Premium Gold 2 dio je opsežne linije proizvodova za zadovoljavanje prehrambenih potreba dojenčadi. Novalac Premium Gold 2 dio je opsežne linije predporočava se raznolikim za zadovoljavanje prehrambenih potreba dojenčadi. Novalac Premium Gold 3 ili Novalac 3 mlečni napitki. Novalac Premium Gold 2 je del obsežnejših linij proizvodov. Za otroke, starejše od 12 mesecev svetujemo prehod na Novalac Premium Gold 3 ili Novalac 3 mlečni napitki.

HR: Majčino mlijeko najbolja je hrana za dojenčad. Miljuna hrana za dojenčad se samo prema препорукama strokovnjaka s področja medicine, prehrane, farmacije ili druge stručne osobe odgovorne za zdravlje maljke i djeteta. Poseban oprez kod upotrebe miljene hrane Novak: potrebno je kod dojenčadi s oslabljjenim imunitetom, nedonošenčičkih ali novorođenčičkih s nizko porodno težu te prije učinkovitosti. Nepravilna priprema ili čuvanje mogu predstavljati rizik po zdravlje. Pri hranjenju bočici pazite da kontakti uključuju mlijene hrane i žuba vašeg djeteta ne bude predug ili preštejte jo povećaju možnost nastanka karijesa. Uvijek operite zube djetetu nakon zadnjeg nočnog obroka.



CALCIUM

VITAMINS

B2, B12, E, D*

GOS, B.lactis, DHA*, ARA, ALA*, LA*

NUCLEOTIDES

Nucleotide / Nukleotidi

	100 g	100 ml
	kJ	kcal
Fett / Maščobe / Masti	25	3,4
- davon gesättigte Fettsäuren / od tega nasičene maščobe / od kojih zasičene masne kiseline	11,1	1,5
- LA (Linolsäure / linolna kislina / linolna kiselina)	4,5	0,6
- ALA (Alpha-Linolensäure / alfa linolenska kislina / alfa linolenska kiselina)	405	55
- DHA (Docosahexaensäure / dokozahexaenojska kislina / dokozahexaenska kiselina)	120	16
- ARA (Arachidonsäure / arahidonska kislina / arahidonska kiselina)	30	4
Kohlenhydrate / Ogljikovi hidrati / Ugljikohidrati	56,1	7,6
- davon Zucker / od tega sladkorji / od kojih šečeri	40,5	5,5
GOS (Galacto-Oligosaccharide) / Galaktoligosaharidi	3,85	0,5
Ballaststoffe / Vlaknine / Vlakna	2,6	0,4
Eiweiß / Beljakovine / Beljančevine	9,4	1,3
Vitamine / Vitamini		
A	450	61
D	12	1,6
E	10	1,4
K	60	8,1
C	65	8,8
Thiamin / Tiamin	0,8	0,11
Riboflavin	1,2	0,2
Niacin	4,7	0,6
B6	0,5	0,07
Folsäure / Folna kislina / Folna kiselina	90	12
Folat	160	22
B12	1,5	0,2
Biotin	17,5	2,4
Pantothensäure / Pantotenska kislina / Pantotenska kiselina	4,9	0,7
Mineralstoffe / Minerali		
Natrium / Natrij	170	23
Kalium / Kalij	590	80
Chlorid / Klorid	545	74
Kalzium / Kalcij	635	86
Phosphor / Fosfor	360	49
Magnesium / Magnezij	60	8,1
Eisen / Železo / Željezo	7,8	1,1
Zink / Cink	3,3	0,4
Kupfer / Baker / Bakar	0,38	0,05
Mangan	0,044	0,006
Fluorid	<0,45	<0,06
Selen	22	3
Jod	92	12
Nucleotide / Nukleotidi	18,6	2,5

Durchschnittliche Zusammensetzung / Hranična vrednost / Hranjiva vrijednost

* Gemäß der Verordnung für Folgemilch. / V skladu z regulativno nadaljevalnih mlek. / Sukladno Uredbi o prijelaznom mlijeku.

Zutaten / Sestavine / Sastočci

AT: Magermilch, pflanzliche Öle (Palm, Soja, Kokosnuss, Raps), Laktose, Maltodextrin, Galacto-Oligosaccharide (Milch), Tricalciumcitrat, Calciumchlorid, Fischöl (DHA), Emulgator (Soyalecithin), Dicalciumphosphat, Magnesiumsulfat, Dinatriumphosphat, Vitamin E (OH-A), Pyridoxalphospat (Vitamin B6), Nicotinamid (Niacin), Calcium-D-Pantothenat, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Retinylacetat (Vitamin A), Pyridoxylhydrochlorid (Vitamin B6), L-Phenylalanin, Kaliumchlorid, Nucleotidyle (Cystein-5'-Monophosphorsäure (AMP), Dinatrium-Uridin 5'-Monophosphat (GMP), Zinksulfat, Antioxidansmittel (Stark topopherolhaltige Extrakte, Ascorbylpalmitat), Kaliumjodat, Milchzucker (Bifidobacterium lactis), Natriumseleinit, Kupfersulfat, Mangansulfat, Si: Posneto mleko, rastlinska olja (palmovo, sojino, kokosovo, repičino), laktosa, maltodekstrini, galactoooligosaharidi (mleko), tricalcijev citrat, kalcijev klorid, ribje olje (DHA), emulgator (sojin lecitin), dikalcijev fosfat, magnezijev sulfat, dinatrijev fosfat, vitamin (natrjev askorbat, DL-tokoferol acetat, nikotinamid, kalcijev D-pantenat, tiaminjev hidroklorid, riboflavin, retinolacetat, pirdoksinjev hidroklorid, folna kiselina, fitomenadion, D-biotin, kolekaliferol, cijanokaliferol, železov diolat, L-izoleucin, L-triptofan, triptamin citrat, L-cistein, ulje cisteine Mortierella alpina (ARA), kalijev hidrokсид, cinkov sulfat, antoksidans (ekstrakt bogat folokerolina, askorbil palmitat), kalijev jodid, milječna kultura (B. lactis), natrjev selenit, bakrov sulfat, manganov sulfat.

Zubereitung / Navodila za pripravo / Uputa za pripremu

1. Flasche und Schnuller reinigen und 5 Minuten lang in Kochendem Wasser abkochen. / Vodo za pripravo obroka zavrite v pokritem lončku. / Stekljenico in pokrovček z dudo prekuhajte v vodi. Vre naj vsaj 5 minut. / Bočico i poklopac sa dudom prekuhajte u vodi. Neka ključa bar 5 minut.
2. Frisches Leitungswasser 5 Minuten lang abkochen. / Vodo za pripravo obroka zavrite v pokritem lončku. Vre naj vsaj 5 minut. / Vodu za pripremu obroka prekuhajte u pokrivenom lončiću. Neka ključa bar 5 minut.
3. Wasser auf 40 °C abkühlen und in die Flasche eingleßen. / Vodo u lončku ohladite na 40 °C in jo prelijte u stekleničko. / Vodu u lončiću ohladite na 40 °C i prelijte u bočicu.
4. Die erforderliche Anzahl an Messlöffeln hinzufügen. / V stekleničko s priloženo merico vsjute predpisano število meric. / Uspite u bočico propisani broj mjerica pomocu priložene mjerice.
5. Babyflasche mit Kunststoffdeckel schließen und schütteln, bis das Pulver im Wasser vollständig aufgelöst ist. / Stekljenico zaprite in dobro pretresete, da se prasek popolno raztopi. / Bočico zatvorite i dobro promučajte da se prasak potpuno otopi.
6. Temperatur (37 °C) an den Innenseiten des Handgelegens überprüfen. / Prijavljjen obrok ohladite do mladnega (37 °C), oz. doler na koži ne cutite ne toplo ne hladno. / Prijemljeni obrok ohladite do mlakog (37 °C), odnosno dok na koži ne osjetite ni hladno ni toplo.